

КОНСТАНТИН ХЕРИНГ

Насочващите симптоми

в нашата

MATERIA

MEDICA

Том III

BRYONIA ALBA

—

CHAMOMILLA

Поредица "Класика"

Quantum

Съдържание

Систематизация. Забележка от преводача.	8-9
<i>Bryonia alba</i>	10
<i>Bufo rana</i>	58
<i>Cactus grandiflorus</i>	72
<i>Cadmium sulphuricum</i>	96
<i>Cainca</i>	104
<i>Physostigma venenosum</i>	114
<i>Caladium seguinum</i>	122
<i>Calcarea arsenicosa</i>	141
<i>Calcarea fluorica</i>	152
<i>Calcarea carbonica ostrearum</i>	159
<i>Calcarea phosphorica</i>	232
<i>Calcarea sulphurica</i>	257
<i>Calendulla officinalis</i>	265
<i>Camphora officinalis</i>	273
<i>Cannabis indica</i>	302
<i>Cannabis sativa</i>	310
<i>Cantharis vesicator</i>	318
<i>Capsicum annum</i>	332
<i>Carbo animalis</i>	348
<i>Carbo vegetabilis</i>	364
<i>Carbolicum acidum</i>	393
<i>Carboneum sulphuratum</i>	410
<i>Carduus marianus</i>	418
<i>Cascarilla</i>	430
<i>Castanea vesca</i>	432
<i>Castoreum</i>	433
<i>Castor equorum</i>	437
<i>Caulophyllum thalictroides</i>	442
<i>Causticum</i>	448
<i>Ceanotus americanus</i>	486
<i>Cedron</i>	488
<i>Allium cepa</i>	497
<i>Cetraria islandica</i>	514
<i>Chamomilla</i>	516

Bryonia alba

Бяла (дива) тиква – Cucurbitaceae (Тиквови)

Сокът от пресния корен, преди цъфтежа. Доказано от Ханеман и публикувано през 1816 във втория том на неговата *Materia Medica Pura*; 208 от неговите собствени симптоми, 102 симптома от студенти, Мишлер, Хомбург, Рюкерт и д-р Е. Щапф, и един симптом от Николай. През 1824 излиза второто издание на втори том: 537 симптома от Ханеман и 242 симптома от други доказващи; допълнителни участници са Херман и Фредерик Ханеман. През 1833 следва трето издание със 781 симптома от предишното. Едно ненужно повторно доказване е направено от 32-ма австрийски лекари, много от които са взели корен от друг вид, *dioica* (черна дива тиква – б.пр.) (както се случило и с *Aconite*); в списанията се появяват и допълнения от О. Пайпър, Лембке, докторите Стоу и Прайс; а накрая и доказването от Беридж с потенция 2М по Йенихен.

¹ **Ум, емоции.** II Частична загуба на съзнание. θ Хидроцефалия.

Безсъзнание.

I Безсъзнание, не може да говори. θ Азиатска холера.

Вцепеняване.

Слаба памет.

I Толкова слаба памет, че мислите му изчезват, сякаш ще припадне, съпроводено с горещина по лицето, особено когато стои изправен.

Объркване в главата, особено в челото.

Объркване в главата с теглене в тила, което достига тилната част на врата, преди да си легне.

Главата е обърквана и болезнена, като след нощни развлечения; няма желание да се надигне, сутрин при събуждане.

Затруднено разбиране.

I Вижда образи и лица, когато затвори очи. θ Тиф.

Видения; умствена възбудимост.

I Нощен делириум.

Делирен говор, особено през нощта.

I Сутрин, при развиделяване, делириум.

I Делириум през нощта за работите от деня. θ Тиф.

Делириум за неговия бизнес; влошава се през нощта, след 3.00 часа.

II При делириума говори за работата си от деня. θ Диария.

I Пациентът иска да си отиде у дома. θ Тиф.

II Желание да стане от леглото и да си отиде у дома. θ Диария.

I Желание за неща, които не може да получи; отказва ги или не ги иска повече, когато му ги предложат.

Дърдори за работа, която трябва да свърши.

I Ирационално говори за своята работа.
 Прибързаност.
 Мълчаливост.
 Съзливо настроение, с главоболие и други оплаквания.
 Обезсърчен; отчаян; раздразнителен.
 Голяма депресия и много намръщено настроение, без никаква причина, точно обратното на обичайната му нагласа.
 Депресия и тревожно очакване за бъдещето.
 Много силно усещане за несигурност, с умствена депресия и тревожно очакване за бъдещето.
I Тревожно очакване; страхливост.
 Тревожно очакване; безпокойство и ужас за бъдещето.
 Тревожност и безпокойство.
I В стаята става много тревожен, подобрява се на открит въздух.
I Тревожност през целия ден, която го принуждава непрекъснато да прави нещо; никъде не намира покой.
II Тревожност за бъдещето, особено на родилното ложе или след това, тя се страхува, че няма да има необходимите средства (пари), за да живее.
 Тревожност, по-силна в стаята, подобрява се на открит въздух.
II Тревожен, жлъчен и забързан.
 Страх от смъртта, която според него приближава.
I Страх от смъртта. *θ* Коклюш.
 Тревожно чувство, което възниква в областта на стернума или сърцето; усещане за притискане или болка.
 Лесно се стряска, при главоболие.
I Отчаян, че няма да се възстанови. *θ* Коклюш.
I Огромна безнадеждност; неразположен към размишления; изтощение на интелектуалните сили.
 Изисква умствена и телесна неподвижност.
I Раздразнително настроение.
I Настроението изведнъж става избухливо, плачливо и намусено.
I Крайно раздразнителен; склонен към уплаха, страх и разгневяване.
 Раздразнително настроение; иска да бъде сам.
II Много раздразнителен; склонен да се гневи; след разгневяване: втрисане, или зачервено лице и горещина в главата.
I Жлъчност. *θ* Диария.
I Жлъчност, раздразнителност и насилие. *θ* Коклюш.
I Намръщен; всяко нещо го кара да губи чувството си за хумор.
I Лошо настроение. *θ* Диария.
I Много заядлив; обременен от ненужна тревога.
 Противоречието лесно провокира гняв, по време на цялото доказване.
 Упорство и страсти.
I Умствено изтощение.

I Сомнамбулизъм.

Безпокойство; желае промяна.

Безпокойство със страх за бъдещето; страх от приближаващата според него смърт.

Безпокойство, при нощна горещина.

I Лоши ефекти от унижение, насилие и гняв.

I Болести от разочарование, унижение и други състояния, когато са съпроводени от втрисане и студенина на тялото.

След като се е гневил, го втриса; червено лице и горещина в главата.

Като последствие от уплаха: болезнена скованост на крайниците.

² **Сетива.** Сетивата са притъпени.

II Разсеяно състояние на сетивата.

I Вцепеняване на главата.

I Огромно объркване в главата, особено в челната област.

I Объркване в главата след ставане от леглото.

I Объркване в главата с теглене в тила, което достига врата, преди да си легне.

I Сутринта при събуждане, главата е обърквана и болезнена, като че ли след нощни развлечения и пианство; не желае да стане от леглото.

I Замаяност сутрин и слабост в крайниците през целия ден.

Замаяност при обръщане на главата или при навеждане.

I Замаяност, особено при изправяне от място, или от приведена напред поза.

Замаяност с усещане за хлабавост в мозъка при навеждане, и когато изправя главата.

Клатушкане напред-назад.

I Сутрин, при ставане от леглото, замаяност и въртене, като че ли главата се върти в кръг.

II Усещане в леглото, сякаш потъва дълбоко надолу.

I Склонност да тича назад.

Световъртеж: сякаш всички обекти се реят; като че ли мозъкът се преобръща; като че ли главата се върти в кръг; при изправяне; или при вдигане на главата; с клатушкане назад.

I Лек световъртеж при изправяне на главата, след като е била приведена напред.

I Световъртеж като въртене, ако седне в леглото, с гадене по средата на гръдния кош; като че ли ще припадне.

I Световъртеж, като че ли някой го е преобърнал наопаки, или сякаш всичко се върти, когато стои изправен.

II Световъртеж, заедно с главоболие в тила; влошаване от движение.

³ **Глава, вътрешно.** I Световъртеж и объркване в главата при най-малкото движение.

I Притискащо челно главоболие, което много се усилва при навеждане.

Натиск навън в челната област и лявата очна ябълка, особено при навеждане.

- II** Пълнота и тежест в челото: като че ли мозъкът е притиснат навън; с кървене от носа; червено, подпухнало лице; влошаване от отваряне или движение на очите; при навеждане; вечер; от движение; подобряване от затваряне на очите; от външен натиск.
- I** Притискаща болка в челото, така че той не може да се навежда.
- I** Притискаща болка в челото и тила; влошаване от движение.
- I** Главоболие, като че ли всичко отвътре се притиска към челото.
- Притискаща болка над лявото око, последвана от тъпа, притискаща болка в тилните възвишения, а оттам разпростираща се по цялото тяло; при бързо движение и след хранене, болката е толкова силна, че изглежда като отчетливо пулсиране в главата.
- Огромна пълнота и тежест в главата, с дълбаещ натиск в посока към челото.
- Разкъсване през челото, после в цервикалните мускули, после в дясната мишница.
- Парене в челото.
- Главоболие в челото и слепоочията, с притискане отвътре навън и усещане при навеждане, сякаш всичко ще изпадне вън от черепа.
- Болка в дясното слепоочие; напрегнато извиване в отделни мускулни фибри.
- Болка в двете слепоочия, притискаща отвътре навън.
- I** Леко теглене в темпоралните кости, отгоре надолу към зигомата, особено от лявата страна.
- Теглеща, разкъсваща болка в дясното слепоочие, която се разпростира най-вече към горните кътници и мускулите на врата.
- II** Теглещо и напрегнато главоболие в областта на слепоочията.
- Разкъсване от едната (дясната) страна на главата, което достига до костите на скулите и челюстите; влошаване при движение, допир и горещина; подобряване при почивка и от външен натиск.
- I** Продължителен бодеж дълбоко в мозъка, от лявата страна, при кашляне.
- Осезаемо туптене на вертекса, със същото туптене и пълнота в черепа, в областта на малкия мозък.
- I** Усещане за тежест, притискаща върху вертекса.
- Туптящо главоболие на върха на главата, сутрин при събуждане.
- π* Забождащо, тласкащо, туптящо главоболие, от челото назад, към тила.
- Главоболие в тила, достигащо до раменете, докато лежи по глъб в леглото, след събуждане сутрин.
- Притискаща болка в тила, теглеща надолу към врата, облекчаваща се към обяд.
- I** Сутринта в леглото, след събуждане, докато лежи по гръб, главоболие в тила, което достига раменете, като тежест, притисната към наранено място.
- I** Силни стрелкащи болки, разпростиращи се към вертекса или към тила; влошават се през нощта или от движение на очите.

- Остра болка в лявото тилно възвишение, която идва и си отива внезапно.
- I** Много силно главоболие, като огромна тежест в главата, която като че ли го накланя на едната или другата страна, с натиск в мозъка отвътре навън и огромно желание незабавно да легне.
- I** Главоболие, като че ли нещо притиска черепа отвътре навън, във всички посоки.
- I** Натиск и пареща болка в главата. *θ* Коклюш.
- Натиск в главата, като че ли мозъкът е прекалено пълен и притиснат навън, повече, докато седи.
- Главоболие, сякаш главата ще се пръсне, със сухи и напукани устни.
- Тласкащо, туптящо главоболие.
- II** Бодежи в главата от челото до тила; при твърдо стъпване.
- I** Продължителен бодеж, дълбоко в мозъка, лявата страна, при кашляне.
- I** Бодежи в главата. *θ* Коклюш.
- Разцепващо главоболие.
- II** Голяма тежест на главата и натиск на мозъка напред.
- I** Конгестивно главоболие, като че ли челото ще се пръсне, с епистаксис.
- I** Горещина в главата.
- II** Наплив на кръв към главата.
- II** Апоплексия.
- II** Енцефалит. *θ* Метастази от миазматични или обривни болести.
- I** Главоболието започва сутрин, не при събуждане, а когато отваря очите за първи път.
- I** Главоболие, сякаш главата ще се пръсне, започва сутринта и постепенно се усилва до вечерта.
- I** Главоболие сутрин, след ставане; потрепващо конвулсивно теглене в горночелюстните и в зигоматичните кости.
- I** Сутрин преди закуска, болка, сякаш главата е стисната от всички страни, с тежест вътре, примесена с бодежи; тя не може да вдигне очи от болката, а ако се наведе, не може да се изправи.
- Главоболие след всяко хранене.
- II** Главоболие, след като се измие със студена вода, когато лицето е изпотено; в такива случаи отварянето на клепачите усилва главоболието.
- I** Винаги при кашляне, движение в главата, подобно на натиск.
- II** Главоболие при навеждане, сякаш съдържанието на главата ще се изсипе през челото.
- II** Главоболие от гладене.
- I** Главоболието се разраства; влошава се от най-слабото движение, като простото отваряне на очите, от навеждане, след ядене и при кашляне, и често е съпроводено от кървене от носа; подобрява се от натиск и затваряне на очите.
- II** Главоболие от запек; тъпа болка в челото и особено притискащо усещане в слепоочията.

I Главоболието се подобрява от превързване на главата.

I Упорито главоболие със запек; главоболие почти всеки ден, започващо веднага след ставане сутрин и усилващо се през деня; влошава се от умствено усилие и от кафе; с често повръщане на малко количество жлъчна течност; изхожданията са сухи, твърди, като прегорели.

II Стомашно, ревматично и конгестивно главоболие, характеризиращо се със световъртеж, тежест в главата, натиск в главата и наплив на кръв към главата.

II Ревматично главоболие в студените, сурови, влажни сезони.

I Хемикрания; хистерично главоболие.

⁴ **Глава, външно.** Малък болезнен участък на челото.

Усилване на болката под вертекса, с болезненост на скалпа, точно под него; болезненост на вертекса, чувства го натъртен.

I Парене на вертекса, близо до челото.

I Горещина на главата, сутрин.

II Горещина на главата: с тъмночервено лице; със студенина по останалата част на тялото; със силна жажда и болка в крайниците, когато ги движи; влошаване вечер.

I Напрежение и разкъсване по външната част на главата; влошаване от движение, допир и в топла стая; подобряване от лежане неподвижно, и от лежане върху болезнената страна.

I Скалпът е много чувствителен към допир; детето не може да понесе дори мека четка по него. θ Пърхут.

I Болезненост в тила и зад ушите; влошава се от допир и в сухо време; подобрява се от лежане на болезнената страна и след изпотяване.

I Мазно изпотяване по главата, подобно на олио, с кисел мирис, по време на сън; през нощта, особено към сутринта.

I Косата изглежда много мазна, с хладна глава; ръцете стават мазни, докато сресва косата си.

II Омазняване на косата.

I Пърхут; скалпът е грапав и неравен.

Пареща горещина или студено изпотяване по главата.

I Студенина по вертекса; със студени ръце, втрисане, вътрешна горещина и неприятно туптене из тялото.

⁵ **Зрение и очи.** I Ужас от светлината. θ Интермитентна треска.

Неприяен към светлината, особено слънчевата.

Оптични илюзии в ярки или призматични цветове.

Блещукане пред дясното око, след обяда.

Появяват се всички цветове на дъгата; всеки обект изглежда покрит с тези цветове.

Буквите се сливат, когато чете.

Очите блестят; плувнали; тъпи или лъскави.

Замъглено зрение.