

# Aethusa cynapium

Магданоз на глупците - Сенникоцветни (*Umbelliferae*)

Често се обърква с магданоз; наркозно-парлива отрова, поради съдържащата се в растението алкалоидна материя, наречена цинапин (*cynapine*). Растението е споменато от Ханеман в Органона. Доказано е от Ненинг през 1828 година, по-късно от Хартлауб-баща; в „Архива“ на Хартлауб и Тринкс са добавени токсичните симптоми (*Annalen, 4, 113, 1833*). Наблюдения при пациенти от Биглер, 1872. Ценните наблюдения на Бругман и Тоуман, *A.H.Z., 72, 56*, и на Кател в *Br.Q., 11, 523, om Medical Times*, са пропуснати от Ален.

<sup>1</sup> **Ум, емоции.** Лежи в безсъзнание, разширени зеници, втрещени очи (дете). Загуба на разбиране; нещо като вцепенение, като че ли има бариера между сетивата и външните обекти.

I Неспособен да чете каквото и да е, след пресилване на ума.

I Неспособност да мисли; объркан.

Не може да задържи никаква мисъл.

II Малоумие, в някои случаи редуващо се с I фурор.

Кретенизъм у деца.

I Халюцинации.

I Представя си, че вижда плъхове през стаята.

I Делириум; той си представя, че вижда котки и кучета.

I Делириум; той скача от прозореца.

Делириум, даже при втрисане.

След чаша вино, всички умствени симптоми стават преобладаващи.

Викове на страдание (у дете).

II Добре разположен, спокоен, предиобед; следобед е злобен, тревожен и тъжен.

II Огромна тъга, когато е сам.

Тревожност, с усещане, че сякаш тежък товар лежи на гърдния му кош.

Постоянна тревожност и чувство на слабост.

I Огромна тревожност и безпокойство; скоро след това, много силни болки в главата и корема.

Огромна необщителност, с тежко чувство в челото.

Мрачен и сърдит, с горещина в главата.

I Навъсен, избухлив, особено следобед и на открит въздух.

Огромна възбуда.

I Тревожност и безпокойство.  $\theta$  Мигрена.

След общуване с хора, всички симптоми изчезват.

<sup>2</sup> **Сетива.** Някакъв вид вцепенение, като че ли има бариера между сетивните му органи и външните обекти.

Замаяност, с главоболие.

І Главата е объркана; мозъкът се усеща стегнато превързан.  
Замаяност; той не може да се държи в изправена позиция.  
Световъртеж: І със сънливост, не може да повдигне главата; замайването секва и главата става гореща; - със сърцебиене.  
Световъртеж и слабост.  
Пълна безчувственост; очите са втречени, зениците са разширени.  
Ступор.

<sup>3</sup> **Глава, вътрешно.** Тежест в челото; заядливост.

Главоболие в цялата предна част на главата, като че ли е силно притиснатата, отзад и отгоре.

І Усещане, като че двете страни на главата се намират в менгеме.

І Притискаща болка в челото, като че ли то ще се разцепи; във върхната точка на болката повръщане, последвано от диария.

І Цял ден, постоянна пулсираща болка в челото отляво, лявото слепочие и страна на главата, облекчавана от натиск (тя се чувства, като че ли трябва да стегне превръзка здраво около главата си) и на открит въздух, влошава се от вървене.

Бодежи и пулсации в главата.

Много силна болка, като че ли мозъкът се разбива на парчета.

І Главоболие със световъртеж, влошава се при ходене и при гледане нагоре.

Много силно главоболие, с жажда и гадене.

Главоболието секва при освобождаването на газове от ануса.

І Главоболие от пет седмици, след потискане на мензиса.

Болките в главата се завръщат периодично, и често са придружавани от бледо лице, треперене в челюстите и болки в областта на прекордиума.

Горещина се надига към главата; тялото става по-топло; лицето почервява и замайването секва.

Неприятна болка в тила. Вижте 31.

<sup>4</sup> **Глава, външно.** І Изтощаваща болка в тила, тилната част на врата и надолу по гръбнака, облекчавана от фрикции с горещо уиски.

І Неспособност да държи изправена главата или да седне в изправено положение.

І Усещане, като че ли някой постоянно я дърпа за косата.

<sup>5</sup> **Очи и зрение.** Гледането нагоре усилва главоболието при световъртеж.

І Зениците са разширени, но чувствителни към допир.

І Зениците са разширени, очите са втречени, тъпи.  $\theta$  Холера инфантум.  
Хронична фотофобия.

Обектите изглеждат много по-големи от естествената им големина.

Зрението е объркано, понякога обектите изглеждат двойни.

Огромна болка в очите; очите са възпалени и наляти с кръв.

І Очите са лъскави и изпъкнали.

- I Очните ябълки са обърнати надолу. *θ* Конвулсии у деца.
- I Пустули по корнеята.
- I Хронично възпаление на ръбовете на клепачите.
- I Слепване на клепачите сутрин, което налага да бъдат смекчени с течност, за да се предотврати изтръгването на миглите.
- Скрофулна офталмия; I подуване на Мейбомиевите жлези.
- <sup>6</sup> **Слух и уши.** Бодежи в ушите, особено в дясното; усещане, като че нещо горещо струи от него.
- Жълт секрет от дясното ухо, с жилещи болки.
- <sup>7</sup> **Нос.** Носът е запушен с гъста слуз; често, но неефективно желание за кихане.
- II Херпесни обриви на върха на носа.
- <sup>8</sup> **Лице.** Разкъсване по лицето, в зигоматичните кости.
- Лицето има студено изражение.
- Недоволно навъсено лице, по време на главоболие.
- I Лицето е бледо. *θ* Мигрена.
- Лицето е хлътнало, землисто бледо, съсухрено. *θ* Азиатска холера.
- Червено, хлътнало лице.
- Едематозен оток на бузите.
- Кръгли и болезнени подувания по лицето, преходни и местещи се от място на място.
- Горещина по лицето с треперене на главата. *θ* Азиатска холера.
- I Лицето е бледо, подпухнало и на червени петна.
- II Изопнатото състояние, започващо в носните крила и разпростиращо се към ъглите на устата, което придава на лицето изражение на огромна тревожност и болка.
- I Чертите на лицето изразяват огромно страдание и болка.
- <sup>9</sup> **Лице, долна част.** Треперене на челюстите.
- Неспособност да преглътне; долната челюст е притисната към горната.
- Брадичката и ъглите на устата се усещат студени.
- <sup>10</sup> **Венци.** Жилене или разкъсване във венците.
- <sup>11</sup> **Вкус, реч, език.** Вкус: горчив; на сирене; на лук; сладникав сутрин при събуждане.
- Речта е възпрепятствана, бавна.
- Чувство, като че ли езикът е твърде дълъг. *θ* Афти.
- Влажен език.
- Езикът е черен.
- <sup>12</sup> **Уста, вътрешно.** Мекото небце е червено и подуто.
- Афти в устата и гърлото; езикът се усеща като че твърде дълъг. Вж. 11.
- <sup>13</sup> **Небце и гърло.** Парене в гърлото.
- Усещане за лютива горещина в устата и гърлото, с огромно затруднение да преглътне.
- Усещане за пристягане, което препятства преглъщането.

Жилене в гърлото, между преглъщанията.

Възпалени афти и пустули в гърлото, които правят състоянието на пациента почти отчаяно.

<sup>14</sup> **Апетит, жажда.** Жажда с пълна загуба на апетит за всякакъв вид храна.

Пареща жажда; т.

Желание за вино, влошаване от употребата му. Вижте 1.

**II** Непоносимост към мляко.

<sup>15</sup> **Хранене и пиене.** Докато се храни: внезапна тежина в челото.

След хранене: Болка под пъпа, изхождания от несмляна храна, суха кашлица.

**I** Регургитация на храна час или повече след хранене.

**II** Подходящо за деца, които не могат да понесат млякото.

Влошаване от кафе.

Желание за вино, но умствените симптоми се усилват след като пие.

<sup>16</sup> **Гадене и повръщане.** **I** Спазматично хълцане.  $\theta$  Мигрена.  $\theta$  Азиатска холера.

**I** Празно оригване.  $\theta$  Мигрена.

Много силно внезапно повръщане: **I** на пенеста млечнобяла субстанция; на жълта течност; **II** последвано от пресечено мляко и сирениста материя.

**I** Повръщане на зеленикава слуз, подобна на изпражненията. **II** Млякото силово се изхвърля, скоро след като е поето; следва слабост, която причинява сънливост.  $\theta$  Кърмачета. Вижте 24.

Обилно повръщане на вода.  $\theta$  Малки деца.

**I** Обилно зеленикаво повръщане.

**I** Гроздето причинява плашещо повръщане, слабост и неописуемо страдание.

Повръща кървава слуз, с подут корем.

**I** Пристъпи на повръщане на връхната точка на главоболието.  $\theta$  Мигрена.

След повръщане, студенина и лепкавост.  $\theta$  Холера инфантум.

Повръщане, с диария.

<sup>17</sup> **Под лъжичката и стомах.** Разкъсващи, раздиращи болки в ямката под лъжичката, разпростиращи се по хранопровода.

**I** Болка в ямката под лъжичката и корема, последвана от гадене, със или без повръщане.

**I** Крампи в стомаха.  $\theta$  Мигрена.

**I** Болезнени контракции на стомаха, толкова силни, че предотвратяват повръщането.  $\theta$  Азиатска холера.

Усещане за лютив горещина в стомаха.

Оплаквания от крампи в стомаха и викове на страдание.

<sup>18</sup> **Хипохондриум.** **I** Болезненост в областта на епигастриума, с гадене.

Бодежи в епигастриума.

Пронизване в десния хипохондриум, следобеда.

Болезнен натиск, с парене и боджи в левия хипохондриум.

Прострелване в левия хипохондриум, често и с дълга продължителност.

Разраненост и болезненост в двата хипохондриума.

Черният дроб е твърд, жълтеникав, далакът е ливиден, езикът е черен; т.

<sup>19</sup> **Корем.** Екстремни, сграбчващи болки в корема.

I Колики, с диария.

I Прекомерно силна, сграбчваща болка в корема.

I Колики, последвани от повръщане, световъртеж и слабост.

II Срязване и много силно повръщане.

II Срязване, с раздуване на корема.

Пристегнат и напрегнат корем.

I Коремът е подпухнал, чувствителен към допир; конвулсии у деца.

θ Гастроентерит.

Много силна колика, последвана от смъртта на момчето.

Коремът е раздут, с напрежение; т.

I Усещане за студенина в корема.

Студенина в корема и долните крайници, особено в левия, с болезненост в червата; облекчение от топли влажни компреси.

Черно-синкаво подуване на корема.

<sup>20</sup> **Изхождане.** Разхлабени изхождания, предшествани от прорязване в корема, с тенезми сутринта след ставане.

I Рядко изхождане прекратява главоболието. θ Мигрена.

I Изпражненията се състоят от частично смляна храна, скоро след хранене или през нощта.

I Диария – изхожданията са зелени, редки, жлъчни, с много силни тенезми преди и след изхождане. θ Конвулсии у деца. θ Гастроентерит.

I Яркожълти или зеленикави воднисти слузести изпражнения; писъци, придърпване на подбедриците нагоре. Дете на възраст 6 месеца.

Евакуациите са редки, яркожълти или зелени и течни, примесени с доста жлъчна течност, с много силни тенезми.

I Сивкаво-зеленикави течни изхождания. θ Азиатска холера.

Кървави изпражнения.

I При изхождане, болезнено присвиване в стомаха. θ Азиатска холера.

I Изключително упорит запек с чувство, сякаш дейността на червата е изчезнала напълно.

<sup>21</sup> **Пикочни органи.** Болка в бъбреците, влошава се от кихане, дълбоко вдишване и лежане.

Режещи болки в пикочния мехур, с чести позиви за уриниране.

Урина: червена, с бял седимент; I обилна, прозрачна като вода; прекалено честа, след усилие.

Нощно напикаване, с повръщане на коагулирано мляко след хранене от шише; зеленикава водниста диария.

Липса на урина. θ Азиатска холера.

- <sup>22</sup> **Мъжки полови органи.** Десният тестис издърпан нагоре, с болка в бъбреците.
- <sup>23</sup> **Женски полови органи.** Потисната менструация.  
I Мензисът потиснат от топла баня.  $\theta$  Главоболие.  
Мензисът е воднист.  
Остри болки в половите органи.  
Пъпчици по външните части, които сърбят, когато жената се затопли.
- <sup>24</sup> **Бременност и кърмене.** Родилни болки, прекалено слаби; нередовни;  
Много силна жилеща болка в млечните жлези; т.  
II Непоносимост към мляко; детето с внезапно и много бурно усилие го повръща, пресечено или не; следва слабост, която го прави сънливо за няколко минути.
- <sup>25</sup> **Глас и ларинкс.** Няма глас.  $\theta$  Азиатска холера.  
Изглежда, че страданието го лишава от говор, остава безмълвен.
- <sup>26</sup> **Дишане.** Кратко дишане, прекъсвано от хълцане.  
Кратко, тревожно, свирещо дишане, докато лежи по гръб.  
Силен задух; т.
- <sup>27</sup> **Кашлица.** Кашлица, с вцепеняваща болка в главата.
- <sup>28</sup> **Гръден кош, вътрешно. Бели дробове.** Бодежи в лявата страна на гръдния кош.  
Усещане, че гръдният кош е сякаш в менгеме, със затруднено дишане.
- <sup>29</sup> **Сърце, пулс, кръвообращение.** Тревожност в прекордиума; т.  
Много силно биене на сърцето.  
I Сърцебиене, при главоболие.  
Сърцебиене, при световъртеж.  
Сърцебиене, с умора и екзалтация; т.  
I Пулсът учестен, малък, някак твърд и неритмичен.  
Пулсът рязък и забързан, пълен.  
I Слаб пресекващ пулс, със сърцебиене и главоболие.  
Пулсът треперлив, понякога не може да се напипа, голямо изтощение.  
 $\theta$  Азиатска холера.  
Бавни силни удари на сърцето, ступор и смърт (у куче).
- <sup>31</sup> **Врат и гръб.** Силна болка в тила и тилната част на врата, разпростираща се по гръбнака, облекчавана от фрикции с горещо уиски.  
Лимфните възли по врата са подути като броеница.  
Усещане, сякаш кръстът се намира в менгеме.  
Болезнен фурункул в сакралната област.  
Чувство, като че болката в гърба ще се подобри от протягане и накланяне силно назад, като при опистотонус.
- <sup>32</sup> **Горни крайници.** Лимфните жлези под мишниците са подути.  
Усещане, като че ли горните крайници доста са се скъсили.  
Изтръпналост на горните крайници.  
Болка около скапулите, разпростираща се към горните крайници.

- І Палците и пръстите на ръцете са свити навътре. θ Конвулсии у деца.
- <sup>33</sup> **Долни крайници. І** Разраняване на бедрата от ходене.  
 Дълбаене и стрелкане в долните крайници, с огромна умора.  
 Пронизване и теглене от левия хълбок в бедрото.  
 Осакатяваща болка в средата на дясното бедро, докато седи. Подобрява се от разтриване.  
 Пронизване в табана, от дясната пета до възглавничките на пръстите.  
 Пълзене в ходилата.
- <sup>34</sup> **Крайници, общо.** Студенина, скованост и вкочаняване в крайниците.  
 Студени крайници и конвулсии на тялото.  
 Обриви в областта на ставите.
- <sup>35</sup> **Почивка. Движение.** Не може да стои изправен: при замайване. Вижте 3.  
 Неспособност да повдигне главата: при световъртеж.  
 Не може да се надигне до седнало положение.  
 Не може да стои изправен: от слабост. Вижте 36.  
 Лягане: болка в бъбреците.  
 Седене: осакатяваща болка в дясното бедро.  
 Усилие: уринира прекалено често; изпотява се от него.  
 Вървене: туптящото главоболие се влошава; главоболието при световъртеж се влошава; причинява разязвявания по бедрата; причинява отпуснатост и премала до степен, която прави много трудно задържането му на крака.
- <sup>36</sup> **Нерви.** Треперене около сърцето с тревожно безпокойство. θ Азиатска холера.  
 Тялото е в конвулсии, със студени крайници; т.  
 І Епилептични спазми, със стиснати палци, червено лице, обръщане на очите надолу, фиксирани зеници, разширени; пяна по устата, сключване на челюстите; малък, твърд и бърз пулс.  
 І Спазми, със ступор и делириум.  
 І Обща болнавоост.  
 Конвулсии. θ Гастроентерит.  
 І Слабост след колики.  
 І Огромна слабост; децата не могат да стоят на крака; не могат да си държат главата изправена.  
 І Огромна слабост и изтощение, със сънливост.  
 І Той лежи разпънат, в безсъзнание.
- <sup>37</sup> **Сън.** Сънливост през целия ден.  
 Копнее за сън.  
 II Детето дреме след пристъпите на повръщане или след изхождане.  
 І На заспиване, завъртане на очите или леки конвулсии.  
 І Сън след главоболие. θ Мигрена.  
 Сопор, разширени зеници; т.  
 Сънят неспокоен първите часове.

Неспокойни нощи; силно желание да задреме, но спокойната почивка е препятствана от често стряскане и прекомерна възбуда.

Дълбок сън, с хъркане.

Сопор, разширени зеници и смърт (у куче).

<sup>38</sup> **Време.** Нощем: изхождания от частично смяна храна; енуреза и повръщане; 21; неспокоен, не може да спи, макар че му се спи.

3-4 часа сутринта: влошаване на всички симптоми.

Сутрин: сладникав вкус на събуждане; тенезми. Вижте 20.

Денем: сънлив.

Предиобед: добре разположен и спокоен.

Следобед: заядлив, тревожен и тъжен; пробуждане в десния хипохондриум.

Към вечерта: влошаване на всички симптоми.

В 18 часа: крампи в стомаха.

<sup>39</sup> **Температури и време (климат).** Често е показано през лятото.

Открит въздух: облекчава туптенето в главата.

Затворено помещение: облекчава умствените състояния, облекчава усещането за подуване в главата, лицето и ръцете.

Топлина: причинява сърбеж. Вижте 23.

Топлината на леглото: причинява сърбеж във везикуларните обриви. Вижте 46.

Влажна горещина: облекчава сърбежа и студенината в корема и долните крайници.

Топла баня: потиска менструацията. Вижте 23.

Горещо уиски: фрикцията с него облекчава болката в тила, врата и гърба.

Миене: усилва усещането за подуване в главата, лицето и ръцете.

<sup>40</sup> **Треска.** Делириум по време на зиморничавата фаза.

Студенина, тръпки, сковане на крайниците.

Кожата гореща, суха; липса на жажда.

Изпотява се при най-малкото усилие.

Не може да понесе отвиване, докато трае изпотяването.

Изпотяването е обилно, студено.

Изпотяването облекчава болестта и тенденцията към делир.

<sup>41</sup> **Пристъпи. I** Периодично главоболие.  $\theta$  Мигрена.

<sup>42</sup> **Място и посока.** Дясна страна: секрети от ухото; бодежи в ухото; усещане за нещо горещо, което струи от ухото; пробуждане в хипохондриума; тестисът се придърпва нагоре; осакатяваща болка в средата на бедрото.

Лява страна: пулсиране в главата; притискане, парене, бодежи и прострелване в хипохондриума; студенина на подбедрицата; бодежи в гръдния кош; пронизване и теглене от хълбока към бедрото; появяване и изчезване на червеникаво-синкави петна по подбедрицата.

Мести се от място на място: болезнени подувания по лицето.



- <sup>43</sup> **Усещания.** Усещане, като че главата, лицето и ръцете са подути; влошава се след измиване; подобрява се, когато влезе в стая.
- <sup>44</sup> **Тъкани.** Екхимози; черни и сини петна навсякъде.  
Цялото тяло е ливидно и подуто; и смърт на момчето; отравяне.  
Аназарка.  
Линеене у деца.
- <sup>45</sup> **Докосване. Пасивно движение. Наранявания.** Докосване: коремът е чувствителен.  
Натиск: облекчава пулсиращото главоболие.  
Триене: с горещо уиски, облекчава болката в тила, врата и гръбнака; облекчава осакатяващата болка в дясното бедро.
- <sup>46</sup> **Кожа.** Сухота на кожата.  
Суха пареща кожа; червени петна.  
Хладна кожа.  $\theta$  Азиатска холера.  
Твърди възли в кожата.  
Склонност към разязвяване на бедрата при ходене.  
В рамките на един ден, поява и изчезване на червеникаво-сини петна по торса и лявата подбедрица, които причиняват превожно очакване на петниста треска; влошаване на всички симптоми към вечерта и през нощта, от 3 до 4 часа.  
Екземата лесно кърви.  
Малки воднисти блистери; сърбеж в леглото.  
Сърбящ обрив при излагане на горещина.  
Херпесни обриви, сърбящи и парещи при горещина.  
Фликтена; т.
- <sup>47</sup> **Житески фази, конституция.** I Деца, по време на поникване на зъбките.  
I Стара жена, през сезона на холерата.  $\theta$  Азиатска холера.
- <sup>48</sup> **Връзки.** Подобно на: *Ant-c* (повръщане на млякото); *Ars*; *Asar*; *Calc* (повръщане на млякото); *Cupr*; *Ires*; *Opium*.  
Сродно със: *Cic*, *Con*, *Oena*.  
Антидотирано от растителни киселини.  
Антидот на *Opium*.