

Arum triphyllum

Трилистна аризема - Индианска ряпа - Змиярникови (*Araceae*)

Въведено в хомеопатията от Константин Херинг през 1856 година (*News*, № 9, стр. 66), след което е прилагано в отчаяни случаи на скарлатина, според съобщенията на лекаря любител Джон Минц, Кантон, Онтарио (вижте *News*, 1852, *American Review*, том 3, стр. 28). Всички характеристики на лекарството са потвърдени в много случаи оттогава досега, вече двадесет и седем години.

Лекарството е доказано от доктор Джийнс през 1844 дълго преди да влезе в употреба; през 1867 Дж. Е. Грам написа върху него една от най-добрите тези в Хомеопатичния колеж на Пенсилвания; частично тя бе публикувана в *Hahnemannian Monthly*.

Две години доктор Грам е доказвал лекарството върху себе си и върху една жена; освен потвърждение на вече известните му ефекти, той значително разшири полезната употреба на *Arum-t*.

Предупреждението за летливостта на така наречения парлив принцип за нас е безполезно.

За първи път *Arum triphyllum* бе използвано при стара жена в една долина на Пенсилвания, и излекувало една от най-лошите форми на скарлатина; лекарството било дадено на прах, направен от изсушената луковица. Доктор Херинг, в първия си случай на злокачествена скарлатина, в едно влажно мазе на Чери Стрийт, приложи тинктура от изсушената луковица; а доктор Липе, който ни бе изпратил всички характеристики, използваше само потенции в спирт, при това от най-високите.

¹ **Ум, емоции.** I Несъзнателен по отношение на това, което прави или на онава, което му се казва. Забравя.

Отсъствие на ума; замаяност.

II Много силен делириум. θ Скарлатина. θ Тиф.

I По време на делириума си бърка в носа; дърпа на едно място или сухите си устни. θ Тифоидна треска.

Буден, неспокоен, пици; делириум в част от времето.

I Мания.

Апатия. Вижте 40.

Раздразнителен нрав.

² **Сетива.** I Оплаква се от замайване, когато го повдигнат. θ Скарлатина.

II Замаяност.

I Замайване и пълнота, с отсъствие на ума.

Главата е лека, сънлива.

³ **Глава, вътрешно.** I Много силно главоболие.

II Тъпо главоболие, горната част се усеща студена, като че ли е отворена и няма никакво покритие.

Главоболие, II натиск от дясната или от двете страни; най-зле от горещо

кафе; подобрява се след обяда, и след закуската.

Разкъсване отдясно, на челото, II слепоочието и ухото, достига надолу до зигоматичната кост.

Бодежи над лявото око.

Внезапно прострелване над лявото око и тила; повтаря се.

Разкъсване, стрелване или бодежи в слепоочията.

Дълбаене отдясно, сутрин при събуждане.

⁴**Глава, външно.** Конвулсивно потрепване по средата на челото.

Конвулсивно потрепване и пърхане на мускулните фибри.

Болка и натъртеност на скалпа при допир по върха на главата.

I Главата е парещо гореща. θ Скарлатина.

I Тиней.

⁵**Зрение и очи.** I Неприязън към светлината.

Замъгленост на зрението, като че ли воал е спуснат пред очите, без болка или замайване, очилата не подпомагат зрението.

Горните клепачи са тежки, при главоболие.

Очите се усещат като след много плач.

II Очите са тежки; сънливост.

II Смъдене на очите.

Напрежение в долните клепачи, като че са подути.

II Притреперване на левия горен клепач.

Вода в очите през целия ден, повече във външните ъгли, ръбовете на клепачите са подути.

I Катар на слъзния сак, с желание да бръкне във вътрешния очен ъгъл при носа.

Бодежи над лявото око.

При завъртане на очите нагоре, прострелване в тила, сутрин.

⁶**Уши.** Парене и разкъсване в лявото ухо.

I Лявата паротидна жлеза е натъртена при допир. θ Скарлатина.

⁷**Нос и обоняние.** II Носът е запушен, по-силно отляво, трябва да диша през устата, влошава се сутрин.

II Кихане; влошава се нощем.

I Носът е влажен, но запушен.

Секретите сутрин са прорязани от нишки кръв; през деня жълта, гъста слуз.

II Течна хрема, парлива.

I Разяждащ жълт носен секрет, ноздрите са разранени. θ Дифтерия.

II Парлив секрет, сукървица, разранява носа отвътре, крилата на ноздрите и горните устни. θ Скарлатина.

II Напитките преминават през носа.

II Носът се усеща запушен, въпреки воднистия секрет. θ Скарлатина.

II Той може да диша само с отворена уста. θ Скарлатина.

II Носът е запушен, със или без обилен жълт секрет.

I Кихане като след простуда, с повтарящи се студени тръпки по цялото тяло, които започват на вертекса; следобед.

II Ноздрите са възпалени, повече отляво; носът, устните и лицето са нацепени, като от студен вятър.

II Постоянно човърка носа, докато потече кръв.

I Желание да бръкне отстрани на носа. θ Катар на слъзния сак.

Много киха през нощта, с пристягане в гърлото.

Огромна горещина по лицето и главата следобед, при обилна хрема.

Секретите са гъсти, жълтеникави, с подуване на мекото небце и натиск.

I Едва може да говори заради слуз в задната част на носа; прокашлянето е трудно.

⁸ **Лице.** Лицето е подуто и червено.

II Горещина по лицето, следобед; при хрема.

II Подуто, подпухнало лице. θ Скарлатина.

I Лицето е нацепено отляво, като че ли е вървял на студен вятър.

⁹ **Лице, долна част.** I Болка в ставата на лявата долна челюст, като че е изкълчена, когато преглъща.

II Устните са като попарени, сутрин.

I Устните са нацепени, като след излагане на студен вятър.

II Устните парят, подути са, напукани и кървят.

II Човърка устните, докато прокървят, ъглите на устата са разранени, напукани и кървят. θ Скарлатина.

II Децата често човъркат и дърпат разранените части, макар че изпитват силна болка и пищят от нея; и все пак продължават да човъркат. θ Скарлатина.

I Устните са много разранени и подути, кожата се бели. θ Дифтерия.

II Наличие на разранени, кървави повърхности върху устните, в букалната кухина, носа и т.н., с много силен сърбеж. θ Скарлатина.

II Подуване на подчелюстните и паротидните жлези, по-силно отляво. θ Скарлатина.

¹⁰ **Зъби.** Болка в развалени зъби; лявата страна, долната челюст; към вечерта.

¹¹ **Вкус, реч и език.** I Езикът е разранен, червен, папилите подути и надигнати. θ Скарлатина.

I Езикът е разцепен, парещ, болезнен.

I Болка по лелия ръб на езика.

II Коренът на езика и небцето се усещат разранени.

Кръгли петна по езика, като че ли е попарен.

Върхът на езика е възпален, с кръгли разранени петна.

Смъдене по езика и небните дъги.

II Езикът е нацепен и кърви.

Сухота и скованост през езика, непосредствено пред и на една линия с предната арка на небцето, със стипчиво усещане, силно като след ядене на райска ябълка.

Езикът е червен, папилите разрошени, сух в центъра.

I Ягодов език.

¹² **Уста, вътрешно.** Гнила миризма от устата. θ Дифтерия.

I Устата се усеща така разранена отвътре, че той не желае да пие. θ Скарлатина.

II Крайно засилено отделяне на слюнка; слюнката е парлива. θ Скарлатина.

II Устата гори и е разранена, така че те отказват да пият и плачат, когато нещо им се предложи. θ Скарлатина. θ Дифтерия.

II Букалната кухина е разранена и кърви.

II Оскъдно, но непрекъснато секретирание на гъста слуз от устата с парене в гърлото.

Устата е много суха, устните са нацепени.

II Устата суха, усеща я, сякаш ще се нацепи, трябва нощем да става, за да пие.

II Устата, устните и мекото небце са разранени и парещи сутрин.

II Много силно чувство за разраненост в устата. θ Скарлатина.

II Устната кухина е покрита с дифтерийни налепи и язви. θ Дифтерия.

¹³ **Гърло.** I Усещане за подуване в мекото небце, когато преглъща; с отделянето на носния секрет сутрин.

I Разраненост, парене и болки в небцето; най-зле при ядене и пиене.

Сливиците са много подути.

Възпалено болезнено гърло, с много слуз от носа, стичаща се през хоаните.

Подуването в гърлото се разпростира нагоре към носа.

I Небните дъги и задните носните ходове са разязвени от разяждащи парливи секрети.

I Като че ли носът е овързан, като че ли е прекалено тесен.

II Пристягане в гърлото (при кихане).

Нито може да дъвче, нито да преглъща.

II Отказва храна и питие, заради болката в гърлото. θ Скарлатина.

Възпалението в гърлото (след 7-мия ден) се подновява; на 12-тия ден вратът му се сковава.

II Постоянно драскане и парене в гърлото, с желание за преглъщане.

II Желание за преглъщане при бодежи в гърлото, което е болезнено при натиск.

II Затруднено преглъщане.

I Жилещо, парещо усещане в гърлото.

Силно парене и разраненост в гърлото.

Парене във фаринкса и глотиса с разраненост в гръдния кош.

Усещане за нещо горещо в гърлото, особено при вдишване.

II Пареща болка в гърлото и в корена на езика, със сухота.

I Парене в гърлото, сутрин докато е още в леглото, подобрява се след ставане.

- I Парене и сухота в гърлото, преди полунощ; след полунощ и към сутринта, много слюз в гърлото, която слиза все по-дълбоко при преглъщане и не се усеща повече сутрин след ставане.
- II Жилава слюз, с гъделичкаща кашлица.
- II Гнилостно възпалено гърло.
- II Гърлото и езикът са много възпалени, парещи болки, гнилостни язви в гърлото. θ Скарлатина.
- I Гърлото е ливидно, осеяно с дълбоки, яростно възпалени язви, които изпускат зловонен секрет. θ Скарлатина.
- Възпалени афти по гърлото.
- II Подуване на жлезите по гърлото и шията.
- I Възпалението в гърлото отива отдясно наляво; вратът е скован; лявата паротидна жлеза е болезнена.
- II Значителен оток на подчелюстните жлези от лявата страна.
- ¹⁴ **Апетит, жажда.** II Децата губят апетит, не искат да играят, плътта им отслабва, получават главоболие и оскъдна урина.
Никакъв апетит.
Желание да пие малко количество всеки път.
- ¹⁵ **Хранене и пиене.** Небцето е възпалено. Вижте 13.
Най-зле е при пиене на кафе, главоболие (вижте 3). Най-зле при пиене или ядене (вижте 13).
Главоболието се подобрява след закуската или обяда.
Оригвания на стомашно съдържимо след обяда.
- ¹⁶ **Гадене.** Гадене; разбъркване в стомаха; замайване.
- ¹⁷ **Стомах.** Крампи в стомаха.
- ¹⁸ **Хипохондриум.** Болка в чернодробната област, първоначално отпред, по-късно отзад.
Болка под левите къси ребра.
- ¹⁹ **Корем.** Търкаляне в корема с чести болезнени позиви за изхождане, сутрин.
Къркорене в червата; газове.
Леки режещи болки, най-зле около обяд.
I Между корема и подбедриците, разранени влажни участъци; същите по опашната област. θ Скарлатина.
- ²⁰ **Ректум и изхождане.** Болезнени позиви с къркорене, принуждават го да стане от леглото; тенезми към вечерта.
Изхождане: II воднисто, тъмнокафяво, с оригвания на храна; меко и безболезнено, рядко, жълто, сутрин; меко, с тенезми; през нощта, по време на сън; всяко следващо изхождане е още по-воднисто от предходното.
II Диария до обяд, като горчица.
I Диарията е тъмножълта, течна. θ Тифоидна треска. Вижте 40.
Воднисто кафяво изхождане по обяд.

От 3.00 до 8.00 часа, воднисто кафяво изхождане, често с тenezми, понякога с повдигания на храна.

I Парене в ануса.

II Огромна болезненост между корема, гениталиите и бедрата, върху и под опашната кост.

I Между корема и подбедриците, разранени влажни участъци.

²¹ **Пикочни органи.** II Чести отделяния на бледа урина.

I Урината е много обилна и бледа. θ Скарлатина.

I Урината е оскъдна или потисната.

I Много оскъдна секреция на урина, понякога не отделя нищо през целия ден¹. θ Скарлатина.

Сърбеж при отвора на уретрата.

²² **Мъжки полови органи.** Разкъсваща болка в десния тестис, понякога достигаща до корема, от обяд до вечерта, повтаряща се; идва внезапно и изчезва внезапно.

Смъдене в края на пениса.

²³ **Женски полови органи.** II Режеща болка във всеки яйчник.

Менструалната кръв е по-тъмна.

Мензисът, потиснат от два месеца, се възобновява.

²⁴ **Бременност и раждане.** Разраненост и болка като от удар в лявата гърда.

Бучки дълбоко в лявата гърда, с болезненост.

Конвулсии по време на поникване на зъбките; дясната страна е хроматива; с потреперване на левия горен клепач.

²⁵ **Ларинкс до бронхи.** I Гласът е дрезгав. θ Скарлатина.

II Силно одрезгавяване. θ Скарлатина.

Говоренето коства усилия.

II Гласът е дрезгав; също от преумора на гласа от говорене или пеене.

II Гласът е несигурен, неконтролируем, променя се непрекъснато; ту е дълбок и кълтящ, ту едва доловим, после писклив и висок.

II Възпалено гърло у чиновници; дрезгавост, най-силна след говорене.

Гласът е дрезгав, дълбок или слаб.

I Загуба на глас: след излагане на северозападния вятър.

II Парене в глотиса или във фаринкса.

Трябва да се прокашля сутрин; по-дрезгав е преди да заговори, по-добре е след това.

I Постоянна болка в ларинкса. θ Скарлатина.

II В областта на ларинкса, значителен вътрешен оток на гърлото.

Вътрешен оток на трахеята, първо отдясно, после отляво.

II Насъбиране на слуз в трахеята.

Слуз в трахеята при кашляне.

π При прокашляне излиза голямо количество слуз. θ Скарлатина.

: Круп.

¹ След като се даде лекарството при скарлатина, пациентът се подобрява веднага, щом количеството на урината се увеличи. – Липе.

Възпаление на ларинкса и фаринкса.

²⁶ **Дишане.** : Астма.

Астматично дишане с хроничен катар.

²⁷ **Кашлица.** Главата и гръдният кош се усещат задръстени, пълни със слуз, без отхрачване.

Честа кашлица с много слуз и обилно отхрачване.

Пареща болка в белите дробове при кашляне.

Гъделичкаща кашлица поради слуз в трахеята; през нощта, след като легне, с неспособност да заспи и дрезгавост.

II Мъчителна, раздираща кашлица, I след събуждане.

II Отхрачване на голямо количество слуз.

: Магарешка кашлица.

²⁸ **Гръден кош, вътрешно, и бели дробове.** II Парене в белите дробове при кашляне, достигащо до ямката под лъжичката.

Разранено чувство в гръдния кош.

II Белите дробове се усещат разранени.

Болезненост в левия бял дроб и мишницата, с натиск в челото.

Бодежи в десния бял дроб и под дясната раменна лопатка.

Главата и гръдният кош се усещат задръстени със слуз.

Усещане за пълнота в гръдния кош и за болезненост в левия бял дроб и мишница.

Болка от дясната страна на гръдния кош, близо до мишницата, под нея и отпред.

II Болка през левия бял дроб, близо до дъното на сърцето.

: Туберкулоза.

²⁹ **Пулс.** Пулсът е учестен.

I Пулсът е 140, твърд и пълен. θ Скарлатина.

³⁰ **Гръден кош, външно.** Болка от лявата страна на гръдния кош, под лявото зърно.

³¹ **Врат и гръб.** II Скован врат; I с непоносимо притискащо главоболие.

Болка в областта на атласа и зъбовидния израстък на аксиса, разпростираща се надясно.

I Разранени, болезнени участъци върху опасната кост.

I Подуване на жлезите по врата и гърлото. θ Скарлатина.

³² **Горни крайници.** Натиск в дясното рамо и между лопатките.

Ръцете са сковани и подути.

³³ **Долни крайници.** Болка в десния хълбок, над трохантера.

Тежест, главно в долните крайници; болка над хълбоците.

Крампи в дясната подбедрица при събуждане сутрин.

Жилеща, промушваща или натъртена болка в табаните.

Болка по средата на лявата тибия (където с години е имало обезцветен участък върху кожата).

В лявото стъпало, болезнено усещане за разместване, едва може да вър-

ви, повече под възглавничката на големия пръст; по-късно, същата болка над коляното; отпред на бедрото.

Гъделичкащ сърбеж в центъра на десния табан.

Стъпалата я болят толкова, че не може да стои изправена; болка има даже когато си издърпва чорапите по крака; толкова много я боли, че ѝ става лошо на стомаха.

³⁴ **Крайници, общо.** Тежест във всички крайници, повече в долните.

³⁵ **Почивка, поза, движение.** При заспиване: стряска се от задушаване.

Стоене изправен: стъпалата са по-зле.

При надигане: замайване.

След ставане от леглото: паренето в гърлото се подобрява.

³⁶ **Нерви. I** Силно безпокойство, детето плаче и се мята във всякакви пози.

θ Дифтерия.

Отпуснат и паднал духом.

Дясната страна е хромава при поникването на зъбките.

Много нервен.

I Огромна слабост или изтощение. θ Тиф.

I Спазми на предмишниците и ръцете; палците са придърпани навътре.

³⁷ **Сън.** Сънливост, веднага след залез.

I Детето е сънливо и глупаво; тъмен, ливиден обрив. θ Скарлатина.

II Прозяване следобед, I с протягане и сънливост. Вижте 40.

Сънливост, прозяване и кихане в 11.00 часа; главоболието се влошава, очите са тежки.

Заспива, както седи на стола, скоро след вечеря.

II Безсъние заради възпалението в устата и гърлото, или заради сърбеж по кожата.

Нервност през нощта, не може да спи.

Неспокоен през нощта, с тежка глава, отпуснатост; паднал духом.

Кошмари.

I При заспиване чувства, че ще се задуши, стряска се като от уплаха.

I Лоша нощ; силен делириум, на петия ден от скарлатинната треска.

I Неспокойно се мята в леглото, иска да избяга.

Преди полунощ парене в гърлото; след полунощ слюз в гърлото и разслабване в червата.

През нощта: главата се влошава; кихане; болка в гърлото; студ пробягва по гърба; приливи на горещина.

Когато се събужда: парене от дясната страна на главата; кашлицата се влошава.

³⁸ **Време.** Сутрин: от 3.00 до 8.00 часа, диария; главата е тъпа; дълбаене в главата; носът запушен; секрет от носа; устните се усещат попарени; устата е възпалена и гори; слюз от задните носни ходове; гърлото се подобрява; позиви за изхождане; прокашляне; крампи в подбедрицата; парене отстрани на главата.

11.00 часа: сънливост; кихане; главоболието се влошава; очите са тежки.
По обяд: режещите болки се влошават; воднисти изхождания.

През деня: очите текат; гъста слуз от носа.

Следобед: кихане и студени тръпки; горещина по лицето и главата; хрема; болка в тестиса; сънливост.

От 16.00 до 21.00: приливи на горещина; парещо лице.

Към вечерта: зъбобол; тenezми.

След залез: сънливост.

Нощем: кихане; пристягане в гърлото; жажда; тenezми; кашлицата се влошава; нервност; безпокойство; главата се влошава; студенина; приливи на горещина.

Преди полунощ: сухото гърло гори.

След полунощ: слуз в гърлото; разслабване в червата.

³⁹ **Температура и време (климат).** Горещо кафе: влошава главоболието.

⁴⁰ **Втрисане, треска, изпотяване.** Повтарящи се втрисания, разпростирани се от вертекса, с кихане като след простуда, следобед.

Студени тръпки пробягват по тялото след силно прозяване, в един и същи час два последователни дни.

Студ пробягва по тялото нощем.

Суха, трескава горещина по кожата.

Приливи на горещина, с парещо лице, от 16.00 до 21.00 часа.

Приливи на горещина нощем.

I Трескавата горещина е много интензивна. θ Скарлатина.

II Тифоидни форми на треската; **I** чопли краищата на пръстите на ръцете и сухите устни, докато прокървят; **II** бъркане в носа; **I** неспокойно мятане в леглото, иска да избяга; **II** несъзнателен за това, което прави или за онова, което му се казва; **II** урината е потисната; **II** силна слабост (последните фази вероятно са придружени от уремия).

I Детето изпада в тифоидно състояние, с апатия. θ Скарлатина.

⁴¹ **Пристъпи.** Болките идват и си отиват внезапно.

Силно и много се прозява, студ пробягва по тялото, в същия час като предишния ден.

⁴² **Място и посока.** Дясна страна: главоболие; разкъсване в челото; болка в тестиса; страната е хромава; бодежи в белия дроб; болка отстрани в гръдния кош; натиск в рамото; болка в хълбока; крампи в подбедрицата; сърбеж по табана.

Отдясно наляво: възпаленото гърло; подуването в трахеята.

Лява страна: бодежи над окото; потреперване на клепача; парене в ухото; паротидната жлеза болезнена; ноздрата запушена и болезнена; болка в ставата на долната челюст; подуване на подчелюстните жлези; зъбобол; болка над коляното, в тибията и в стъпалото.

Отгоре надолу: разкъсване в челото.

Отдолу нагоре: подуване в гърлото.

Отпред назад: болка в черния дроб.

⁴³ **Усещания.** Горната част на главата се усеща студена, като че ли е отворена.

Като че ли мекото небце е подуто.

Като че ли е стегнато привързан в гърлото.

Като че ли е изкълчено: в лявото стъпало; над коляното.

Прорязване в корема; в яйчниците.

Дълбаене: в дясната страна на главата.

Бодежи: над лявото око; в слепоочията; в гърлото; в десния бял дроб; под дясната раменна лопатка.

Жилене: в гърлото; в табаните.

Прострелване: над лявото око и в тила.

Промушване: в табаните.

Чувство за попарване: на участъци върху езика.

Парене: в ухото; устните; по езика; по небцето; в гърлото; във фаринкса; в глотиса; по корена на езика; в ануса; в белите дробове; в мишницата.

Смъдене: по езика; по небните дъги; в края на пениса.

Болезненост: по скалпа; на езика; в устата; на небцето; в гръдния кош; в лявата паротидна жлеза; в лявата гърда; в белите дробове.

Разраненост: в гърлото; в гръдния кош.

Драскане: в гърлото.

Разкъсване: отдясно в челото, слепоочието и ухото, към челюстната кост; в слепоочията; в десния тестис.

Болка: в дясната млечна жлеза.

Натиск: отстрани на главата; в челото; в дясното рамо и между лопатките.

Натъртена болка: в лявата млечна жлеза; в табаните.

Чувство за навяхване: в лявата челюстна става.

Крампа: в стомаха; в дясната подбедрица.

Пристягане: в гърлото.

Напрежение: в клепачите.

Неопределена болка: по небцето; в чернодробната област; под ребрата; в ларинкса; в дясната половина на гръдния кош; през левия бял дроб; в дъното на сърцето; под лявото зърно; в областта на атласа и зъбовидния израстък на аксиса; в десния хълбок; над хълбоците; в лявата тибия; в стъпалата.

Притреперване: на левия горен клепач.

Пълнота: в гръдния кош.

Тежест: във всички крайници.

Горещина: по лицето и главата; в гърлото.

Сухота: в гърлото.

Сърбеж: на отвора на уретрата; в средата на десния табан; по обривите.

⁴⁵ **Докосване. Пасивно движение. Наранявания.** Допир: скалпът е болез-

нен; паротидната жлеза е болезнена.

Натиск: гърлото боли.

Чоплене: носа, устните и пръстите на ръцете кървят.

Преглъщане: болката в долната челюст се влошава; усещане за подуване в мекото небце.

Пиене: устата гори по-силно; болките в небцето се влошават.

Ядене: болките в небцето се влошават.

Сврхупотреба на гласа: дрезгавост.

Говорене: засилва се дрезгавостта; подобрява се дрезгавостта.

Кашляне: парене в белите дробове; парене в главата.

Обуване на чорапите: стъпалата болят.

⁴⁶ **Кожа. II** Сърбеж при излющването, следващо скарлатинения обрив.

II Обрив навсякъде по тялото, със силен сърбеж и безпокойство. θ Скарлатина.

I Екзантема, подобна на скарлатинен обрив; кожата се излющва след това.

II Излющването настъпва два или три пъти, на големи люспи, при скарлатина.

II Малки, кръгли, червени, твърди пъпчици по цялото тяло, подбедриците, мишниците и лицето.

I Обривът е разположен повече на кръпки, отколкото равномерно. θ Скарлатина.

II Скарлатина, когато характеризиращите симптоми по носа, устата и гърлото (вижте 7, 12, 13) са факт; треската е много интензивна; **I** в един случай разраненост надолу по вътрешните страни на двете бедра.

I Поява на петехии. θ Скарлатина.

⁴⁷ **Житейски фази. Конституция. II** Чиновници, оратори, певци, актьори, аукционери; даже и в най-високите потенции, една капка възстановява гласа за няколко часа.

Момче на 6 години. θ Скарлатина; след като *Bell, Ant-t, Sulph* и *Lyc* се окажат не особено полезни.

⁴⁸ **Връзки.** Това лекарство не бива да бъде давано в ниски потенции или да бъде повтаряно много често, защото често следват лоши ефекти. – Липе.

Антидоти: суроватка; *Lac-ac, Acet-ac, Puls*.

Семейни връзки: *Arum-d, Arum-m, Calad*.

Сравнете: *Ail* (при скарлатина, депресия, глупост, сънливост); *Am-c* (парлив секрет от носа при скарлатина, но по-тежко е засегната дясната паротидна жлеза, а сънливостта е много отчетлива); *Am-m* (при скарлатина, секретът от носа е по-гъст, прави носа разранен отвътре, носът е запушен само през нощта или само от едната страна); *Arg-n* (езикът при скарлатина има щръкнали, изпъкнали папили; много е възпален, върхът е червен и болезнен; болезнени и чер-